

Bayer plc	 Bayer HealthCare Bayer Schering Pharma
Bayer House Strawberry Hill Newbury Berkshire RG14 1JA United Kingdom	
Telephone:	+44 (0)1635 563 000
Facsimile:	+44 (0)1635 563 393
Company Web Site:	http://www.bayer.co.uk

A causa di un cambiamento nella regolamentazione, il contenuto del seguente foglietto illustrativo potrebbe variare da quello che si trova all'interno della confezione del medicinale. Si prega di comparare la data di revisione alla fine del foglietto illustrativo per stabilire se vi siano state eventuali modifiche. Se avete dubbi o domande sul farmaco, siete pregati di contattare il vostro medico o farmacista.

Bayer Health Care

Foglietto illustrativo: informazioni per il paziente

Levonelle compressa da 1500 microgrammi Levonorgestrel

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di prendere questa medicina.

- Conservare questo foglietto illustrativo. Si potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- In caso di ulteriori domande, chiedere al proprio medico o farmacista
- Questa medicina è stata prescritta per l'uso personale. Non passarla ad altri. Ciò potrebbe compromettere la loro salute, anche se i sintomi che presentano sono uguali ai suoi.
- Se un qualsiasi effetto collaterale diventasse serio o se si notasse un effetto collaterale non elencato in questo foglietto illustrativo si è pregati di riferirlo al proprio medico o farmacista.

In questo foglietto illustrativo:

1. Cos'è Levonelle 1500 e per cosa viene utilizzato
2. Prima di prendere Levonelle 1500
3. Come prendere Levonelle 1500
4. Possibili effetti collaterali
5. Come conservare Levonelle 1500
6. Ulteriori informazioni

1. Cos'è Levonelle e per cosa viene utilizzato

Levonelle 1500 è un contraccettivo d'emergenza che può essere usato entro le 72 ore (3 giorni) da un rapporto non protetto o nel caso di fallimento dell' abituale sistema anticoncezionale. Levonelle 1500 contiene un ormone sintetico chiamato levonorgestrel. Previene circa l'84% delle

gravidezze se viene assunto entro le 72 ore dal rapporto a rischio. Non previene tutte le gravidanze ed è più efficace prima viene assunto a seguito del rapporto non protetto. E' meglio assumerlo entro 12 ore che aspettare di assumerlo il 3° giorno.

Si ritiene che Levonelle 1500 funzioni:

- impedendo alle ovaie di rilasciare un ovulo,
- impedendo allo sperma di fecondare un ovulo qualora l'abbiate già rilasciato
- o impedendo all'eventuale ovulo fecondato di attaccarsi alle pareti uterine.

Levonelle 1500 previene una gravidanza solo se viene assunto entro 72 ore dal rapporto a rischio. Non funziona se siete già incinte. Se avete un rapporto non protetto dopo aver assunto Levonelle 1500, questo farmaco non vi proteggerà da una possibile gravidanza.

2. Prima di assumere Levonelle 1500

Non usate Levonelle 1500 se:

- siete allergiche (ipersensibili) al levonorgestrel o a uno qualsiasi degli ingredienti di Levonelle 1500. (vedere sezione 6).

Prendete ulteriori precauzioni con Levonelle 1500:

Se rientrate in uno dei seguenti casi, comunicatelo al medico prima di assumere Levonelle 1500 poiché la contraccezione d'emergenza potrebbe non essere adatta a voi.

- siete già incinte o pensate di poter essere già incinte, poiché questa medicina non funzionerà se siete già incinte.

Potreste essere già incinte se:

- il vostro periodo è in ritardo di più di 5 giorni o se avete un sanguinamento insolito al momento in cui avete il vostro prossimo periodo,
- se avete avuto un rapporto non protetto da più di 72 ore o dal momento del vostro ultimo periodo.

Dovete anche comunicare al vostro dottore se:

- avete patologie all'intestino (ad esempio il morbo di Crohn) che interferiscono con il modo in cui digerite il cibo
- se avete seri problemi a livello epatico
- se avete una storia di gravidanze extrauterine (quando il feto si sviluppa fuori dall'utero)
- se avete una storia di infiammazioni alle tube di Falloppio (salpingitis).

Aver avuto una gravidanza extrauterina e una infezione alle tube di Falloppio aumenta il rischio di una nuova gravidanza extrauterina.

Il vostro dottore potrebbe decidere che Levonelle 1500 non è adatto a voi o che un altro tipo di contraccezione di emergenza è più indicato.

Assumere altre medicine

E' pregata di riferire al suo dottore o farmacista se sta assumendo o ha assunto di recente qualsiasi altra medicina, incluso le medicine per cui non serve la prescrizione. Dica al suo dottore se sta assumendo una delle medicine sotto elencate, poichè tali medicine potrebbero impedire a Levonelle 1500 di funzionare correttamente:

- barbiturici e altre medicine usate per trattare l'epilessia (ad esempio primidone, phenytoin, e carbamazepine).
- medicine usate per trattare la tubercolosi (ad esempio, rifampicin, rifabutin).
- un trattamento per la cura dell'HIV (ritonavir)
- un medicinale usato per il trattamento delle infezioni funginee (griseofulvin)
- rimedi erboristici contenenti iperico o erba di S. Giovanni
- una medicina chiamata ciclosporina (sopprime il sistema immunitario)

Se è preoccupata dalle malattie sessualmente trasmesse

Questa medicina non la proteggerà dalle malattie sessualmente trasmesse, solo i preservativi possono farlo. Chieda consiglio al suo medico, al consultorio o al farmacista se è preoccupata per questo motivo.

Quanto spesso si può usare Levonelle 1500

Dovrebbe usare Levonelle 1500 solo in caso di emergenza e non come un metodo anticoncezionale regolare. Se Levonelle 1500 viene usato più di una volta all'interno di un ciclo mestruale, è meno affidabile ed è più probabile che scombini il suo ciclo mestruale (periodo).

Levonelle 1500 non è efficace come i metodi anticoncezionali regolari. Il suo medico o il consultorio potranno darle più informazioni sui sistemi anticoncezionali di lungo termine, I più efficaci nel prevenire una gravidanza indesiderata.

Gravidanza

Non dovrebbe assumere questa medicina se è già incinta. Se rimane incinta anche dopo aver preso questa medicina è importante che si rivolga al suo medico. Non ci sono prove che Levonelle 1500 danneggi il feto all'interno dell'utero. Nonostante ciò il suo medico potrebbe voler controllare che la gravidanza non sia extrauterina (quando il feto si sviluppa all'esterno dell'utero).

Questo è molto importante specialmente in caso si generasse un severo dolore addominale dopo l'assunzione di Levonelle 1500 o se si ha avuto una gravidanza extrauterina, un intervento alle tube di Falloppio o una malattia infiammatoria alle pelvi in precedenza.

Allattamento

Chieda consiglio al suo medico o farmacista prima di assumere qualsiasi medicina.

Le donne che allattano possono usare Levonelle 1500, ma devono prendere le seguenti precauzioni.

Quantità molto piccole dell'ingrediente attivo di questa medicina potrebbero comparire nel latte materno. Non si ritiene che ciò possa rappresentare un pericolo per il bambino. Ad ogni modo, se è preoccupata può assumere la compressa immediatamente dopo una poppata e quindi levarsi il latte con una pompetta per sei ore e scartarlo. In questo modo ridurrà la quantità di principio attivo che il

suo bambino potrebbe assumere attraverso il latte materno.

Guidare e usare macchine

E' poco probabile che la sua compressa di Levonelle 1500 abbia un impatto sulla sua capacità di guidare o usare macchine. In ogni caso, se sente giramento alla testa non guidi nè usi macchinari.

Informazioni importanti su alcuni ingredienti di Levonelle 1500

Ogni compressa di Levonelle 1500 contiene 142,5 mg di lattosio. Se il suo medico le ha detto che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti il suo medico prima di assumere questa medicina.

3. Come assumere Levonelle 1500

Usi sempre Levonelle 1500 esattamente come prescritto dal suo medico. Se non è sicura, contatti il suo medico o farmacista.

Questa medicina non è raccomandata per l'uso al di sotto dei 12 anni d'età.

- Prenda la compressa il prima possibile, preferibilmente entro 12 ore e non oltre le 72 ore (3 giorni) dopo il rapporto non protetto. Levonelle 1500 può essere presa in qualsiasi momento del suo ciclo mestruale, posto che non sia già incinta o pensi di essere incinta. Non mastichi la compressa, l'ingerisca con dell'acqua. Non ritardi l'assunzione. La compressa funziona meglio prima la si prende dopo il rapporto non protetto.
- Se sta già usando un metodo anticoncezionale regolare, come la pillola anticoncezionale, può continuare a prenderla al solito orario.

Se si verifica un altro rapporto non protetto dopo l'uso di Levonelle 1500 (anche all'interno dello stesso ciclo mestruale), la compressa non avrà effetto anticoncezionale e c'è di nuovo il rischio di gravidanza.

Cosa fare in caso di vomito

Se vomita entro 3 ore dall'assunzione della compressa, dovrà assumere un'altra compressa. Dovrà contattare il suo farmacista, medico o consultorio immediatamente per avere un'altra compressa.

Dopo aver preso Levonelle 1500

Dopo aver preso Levonelle 1500, se desidera avere un rapporto sessuale, e non usa la pillola anticoncezionale, dovrà usare un preservativo o un diaframma con spermicida fino al suo prossimo ciclo mestruale. Questo perchè Levonelle 1500 non funzionerà se avrà di nuovo un rapporto sessuale non protetto, prima del prossimo ciclo mestruale.

Dopo aver assunto Levonelle 1500 è pregata di prendere appuntamento con il suo medico per una visita circa 3 settimane dopo, per assicurarsi che Levonelle 1500 abbia funzionato. Se il suo ciclo è in ritardo di più di 5 giorni o è insolitamente leggero o abbondante, dovrebbe contattare il suo medico il prima possibile. Se rimane incinta anche dopo aver assunto questa medicina, è importante che contatti il suo medico.

Il suo dottore le potrà anche spiegare quali sono i metodi anticoncezionali di lungo periodo, che sono più efficaci nel prevenire eventuali gravidanze indesiderate.

Se continua ad usare l'abituale anticoncezionale ormonale, come la pillola anticoncezionale, e non ha un sanguinamento durante la settimana di pausa, contatti il suo dottore per assicurarsi di non essere incinta.

Il suo prossimo ciclo mestruale dopo l'assunzione di Levonelle 1500

Dopo l'uso di Levonelle 1500 il suo ciclo sarà di solito normale e inizierà il giorno giusto; a volte però il suo ciclo potrebbe venire qualche giorno prima o dopo di quanti ci si aspetta. Se il suo ciclo inizia più di 5 giorni dopo della data in cui ce lo aspettava, se registra un sanguinamento 'anormale' o se pensa di poter essere incinta, dovrebbe controllare se è incinta o meno con un test di gravidanza.

Se prende più dosi di Levonelle 1500 di quelle che dovrebbe

Sebbene non siano stati riportati casi di pericolosi effetti collaterali dovuti dall'assunzione di più compresse alla volta, potrebbe sentire nausea, vomitare o avere sanguinamento vaginale. Dovrebbe chiedere consiglio al suo farmacista, medico o consultorio, specialmente se ha vomitato poichè la compressa potrebbe non aver funzionato correttamente.

Se ha ulteriori domande sull'uso di questo prodotto, chieda al suo medico o farmacista.

4. Possibili effetti collaterali

Come tutte le medicine, Levonelle 1500 può generare effetti collaterali, sebbene questi non siano riscontrati in tutti i casi.

Molto comuni (più di una donna su 10)

- nausea
- potrebbe avere dei sanguinamenti irregolari fino al suo prossimo periodo
- potrebbe sentire dolore addominale
- stanchezza
- mal di testa

Comuni (da 1 a 10 donne su 100)

- Vomito - in caso di vomito legga la sezione "Cosa fare in caso di vomito"
- Il suo ciclo potrebbe modificarsi. La maggioranza delle donne ha un periodo normale e nei tempi giusti, tuttavia alcune potrebbero averlo prima o dopo del normale. Si potrebbero verificare anche delle perdite irregolari o dello spotting fino al prossimo ciclo. Se il suo ciclo è in ritardo di più di 5 giorni oppure è insolitamente leggero o abbondante dovrebbe contattare il suo medico il prima possibile.
- Potrebbe sentire sensibilità al seno, avere diarrea, sentire giramenti alla testa dopo l'assunzione di questa medicina.

Molto rari (meno di una donna su 10.000)

- sfoghi cutanei, orticaria, prurito, edema facciale

Se uno qualsiasi di questi effetti collaterali diventasse serio o se si notasse un effetto collaterale non descritto da questo foglietto illustrativo, lo riferisca al suo medico o farmacista.

5. Come conservare Levonelle 1500

Tenere fuori portata dai bambini.

Non usare Levonelle 1500 dopo la data di scadenza che è indicata sulla confezione dopo EXP. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

Conservare nella confezione originale per proteggere dalla luce.

Le medicine non dovrebbero essere gettate tra i rifiuti domestici. Chieda al suo farmacista come liberarsi delle medicine non più utilizzabili. Queste misure aiuteranno a proteggere l'ambiente.

6. Ulteriori informazioni

Cosa contiene Levonelle 1500

Il principio attivo è il levonorgestrel. Ogni compressa contiene 1500 milligrammi di levonorgestrel. Gli altri ingredienti sono amido di patata, amido di mais, colloidal silica anhydrous, magnesium stearate (E572), talco (E533b) e lattosio monoidrato.

Come appare Levonelle 1500 e contenuto della confezione

Ogni confezione di Levonelle 1500 contiene un trattamento completo consistente in una compressa bianca e rotonda su cui è impresso "G00" su un lato.

Detentore dell'autorizzazione al commercio

Bayer Schering Pharma AG Mullerstrasse 170-178., D-13353 Berlin, Germany o Schering GmbH und CO Produktions KG Döbereinerstrasse 20, D-99427 Weimar, Germany o Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21., H-1103 Budapest, Hungary L

Levonelle 1500 è distribuita in UK da Bayer plc Bayer House, Strawberry Hill, Newbury, Berkshire RG14 1JA. UK

Levonelle® è un marchio registrato della Bayer Schering Pharma AG. Questo foglietto illustrativo è stato approvato nel gennaio 2010.

Bayer plc Bayer House Strawberry Hill Newbury Berkshire RG14 1JA United Kingdom Telephone: +44 (0)1635 563 000 Facsimile: +44 (0)1635 563 393 Company Web Site: <http://www.bayer.co.uk>

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

Levonelle 1500 microgram tablet Levonorgestrel

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:

1. What Levonelle 1500 is and what it is used for
2. Before you take Levonelle 1500
3. How to take Levonelle 1500
4. Possible side effects
5. How to store Levonelle 1500
6. Further information

1. WHAT LEVONELLE 1500 IS AND WHAT IT IS USED FOR

Levonelle 1500 is an emergency contraceptive that can be used within 72 hours (3 days) of unprotected sex or if your usual contraceptive method has failed.

Levonelle 1500 contains a synthetic hormone like substance called levonorgestrel. It prevents about 84% of expected pregnancies when you take it within 72hrs of having unprotected sex. It will not prevent a pregnancy every time and is more effective if you take it as soon as possible after unprotected sex. It is better to take it within 12hrs rather than delay until the third day.

Levonelle 1500 is thought to work by:

- stopping your ovaries from releasing an egg;
- preventing sperm from fertilising any egg you may have already released; or
- stopping a fertilised egg from attaching itself to your womb lining.

Levonelle 1500 can only prevent you becoming pregnant if you take it within 72hrs of unprotected sex. It does not work if you are already pregnant. If you have unprotected sex after taking Levonelle 1500, it will not stop you from becoming pregnant.

2. BEFORE YOU TAKE LEVONELLE 1500

Do not use Levonelle 1500

- if you are allergic (hypersensitive) to levonorgestrel or any of the other ingredients of Levonelle 1500 (see section 6).

Take special care with Levonelle 1500

If any of the following points apply to you, tell your doctor before you take Levonelle 1500 as emergency contraception may not be suitable for you.

- you are pregnant or think that you may already be pregnant; as this medicine will not work if you are already pregnant.

You may already be pregnant if:

- your period is more than 5 days late, or you have experienced unusual bleeding when your next period is due
- you have had unprotected sex more than 72 hours ago, and since your last period

You should also tell your doctor if:

- you have a disease of your small bowel (such as Crohn's disease) that interferes with the way you digest your food
- you have severe liver problems
- you have a history of ectopic pregnancy (where the baby develops somewhere outside the womb)
- you have a history of inflamed fallopian tubes (salpingitis)

A previous ectopic pregnancy and a previous infection of the fallopian tubes increase the risk of a new ectopic pregnancy.

Your doctor may decide that Levonelle 1500 is not suitable for you, or that another type of emergency contraception would be better for you.

Taking other medicines

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

Tell your doctor if you are taking any of the medicines listed below, as these medicines may prevent Levonelle 1500 from working properly:

- barbiturates and other medicines used to treat epilepsy (for example, primidone, phenytoin, and carbamazepine).
- medicines used to treat tuberculosis (for example, rifampicin, rifabutin).
- a treatment for HIV infection (ritonavir)
- a medicine used to treat fungal infections (griseofulvin)
- herbal remedies containing St John's wort (*Hypericum perforatum*)
- a medicine called ciclosporin (suppresses the immune system)

If you are worried about sexually transmitted diseases

This medicine will not protect you against sexually transmitted diseases, only condoms can do this. Ask your doctor, nurse, family planning clinic or pharmacist for advice if you are worried about this.

How often can you use Levonelle 1500

You should only use Levonelle 1500 in emergencies and not as a regular method of contraception. If Levonelle 1500 is used more than once in a menstrual cycle, it is less reliable and it is more likely to upset your menstrual cycle (period).

Levonelle 1500 does not work as well as regular methods of contraception. Your doctor, practice nurse or family planning clinic can tell you about long-term methods of contraception which are more effective in preventing you from getting pregnant.

Pregnancy

You should not take this medicine if you are already pregnant. If you do become pregnant even after taking this medicine, it is important that you see your doctor. There is no evidence that Levonelle 1500 will harm a baby that develops in your uterus/womb. Nevertheless, your doctor may want to check that the pregnancy is not ectopic (where the baby develops somewhere outside the womb). This is especially important if you develop severe abdominal pain after taking Levonelle 1500 or if you have previously had an ectopic pregnancy, Fallopian tube surgery or pelvic inflammatory disease.

Breast-feeding

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Women who breast-feed can use Levonelle 1500 but should take the following measures.

Very small amounts of the active ingredient of this medicine may appear in your breast milk. This is not thought to be harmful to the baby. However if you are worried you can take your tablet immediately after a breast-feed and then drain your milk with a breast pump for 6 hours after taking Levonelle 1500 and throw away the milk. In this way you can reduce the amount of active ingredient your baby may take in with the breast milk.

Driving and using machines

Your Levonelle 1500 tablet is unlikely to affect your ability to drive a car or use machines. However, if you feel tired or dizzy do not drive or operate machinery.

Important information about some of the ingredients of Levonelle 1500

Each Levonelle 1500 tablet contains 142.5mg lactose. If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.

3. HOW TO TAKE LEVONELLE 1500

Always use Levonelle 1500 exactly as your doctor has told you. You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

This medicine is not recommended for use in children under 12 years of age.

- Take the tablet as soon as possible, preferably within 12 hours, and no later than 72 hours (3 days) after you have had unprotected sex. Levonelle 1500 can be taken at any time in your menstrual cycle assuming you are not already pregnant or think you may be pregnant. Do not chew the tablet, swallow it whole with water. Do not delay taking the tablet. The tablet works better the sooner you take it after having unprotected sex.
- If you are already using a regular method of contraception such as the contraceptive pill, you can continue to take this at your regular times.

If another unprotected intercourse takes place after the use of Levonelle 1500 (also if this is during the same menstrual cycle), the tablet will not exert its contraceptive effect and there is again the risk of pregnancy.

What to do if you are sick (vomit)

If you are sick (vomit) within three hours of taking the tablet, you should take another tablet. You will need to contact your pharmacist, doctor, practice nurse or family planning clinic immediately for one more tablet.

After you have taken Levonelle 1500

After you have taken Levonelle 1500, if you want to have sex, and are not using the contraceptive pill, you should use condoms or a cap plus spermicide until your next menstrual period. This is because Levonelle 1500 won't work if you have unprotected sex again, before your next period is due.

After you have taken Levonelle 1500, you are advised to make an appointment to see your doctor about three weeks later, to make sure that Levonelle 1500 has worked. If your period is more than 5 days late or is unusually light or unusually heavy, you should contact your doctor as soon as possible. If you do become pregnant even after taking this medicine, it is important that you see your doctor.

Your doctor can also tell you about longer-term methods of contraception which are more effective in preventing you from getting pregnant.

If you continue to use regular hormonal contraception such as the contraceptive pill and you do not have a bleed in your pill-free period, see your doctor to make sure you are not pregnant.

Your next period after you took Levonelle 1500

After the use of Levonelle 1500, your period is usually normal and will start at the usual day; however sometimes, this will be a few days later or earlier. If your period starts more than 5 days later than expected, an 'abnormal' bleeding occurs at that time or if you think that you might be pregnant, you should check whether you are pregnant by a pregnancy test.

If you take more Levonelle 1500 than you should

Although there have been no reports of serious harmful effects from taking too many tablets at once, you may feel sick, actually be sick (vomit), or have vaginal bleeding. You should ask your pharmacist, doctor, practice nurse or family planning clinic for advice, especially if you have been sick, as the tablet may not have worked properly.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, Levonelle 1500 can cause side effects, although not everybody gets them.

Very common (affects more than 1 user in 10):

- Feeling sick (nausea)
- You might have some irregular bleeding until your next period

- You might have lower abdominal pain
- Tiredness
- Headache

Common (affects 1 to 10 users in 100):

- Being sick (vomiting). If you are sick, read the section ‘What to do if you are sick’ (vomit) (see page 3).
- Your period might be different. Most women will have a normal period at the expected time, but some may have their period later or earlier than normal. You might also have some irregular bleeding or spotting until your next period. If your period is more than 5 days late or is unusually light or unusually heavy, you should contact your doctor as soon as possible.
- You might have tender breasts, diarrhoea, feel dizzy after taking this medicine.

Very rare effects (affects less than 1 user in 10,000):

- rash, urticaria, pruritus, face oedema

If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

5. HOW TO STORE LEVONELLE 1500

Keep out of the reach and sight of children.

Do not use Levonelle 1500 after the expiry date which is stated on the package after EXP. The expiry date refers to the last day of the month

Store in the original packaging in order to protect from light.

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. FURTHER INFORMATION

What Levonelle 1500 contains

The active substance is levonorgestrel. Each tablet contains 1500 micrograms of levonorgestrel. The other ingredients are potato starch, maize starch, colloidal silica anhydrous, magnesium stearate (E572), talc (E533b) and lactose monohydrate.

What Levonelle 1500 looks like and contents of the pack

Each pack of Levonelle 1500 contains a complete treatment which is one round, white tablet with an impressed mark of “G00” on one side.

Marketing Authorisation Holder

Medimpex UK Limited
127 Shirland Road, London, W9 2EP, UK

Manufacturer

Bayer Schering Pharma AG
Mullerstrasse 170-178., D-13353 Berlin, Germany
or
Schering GmbH und CO Produktions KG
Döbereinerstrasse 20, D-99427 Weimar, Germany
or
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21., H-1103 Budapest, Hungary

Levonelle 1500 is distributed in the UK by

Bayer plc
Bayer House, Strawberry Hill, Newbury, Berkshire RG14 1JA. UK

Levonelle® is a registered trademark of Bayer Schering Pharma AG.

This leaflet was last approved in January 2010